
静脉药物给用:

静脉推注



请参阅您的 "输液治疗 入门指南"手册, 了解额外信息。

本文信息不旨在 替代专业建议。 请始终遵循您的医生、 护士 或药剂师的建议。



入门指南

- ·在使用前至少 ____(分钟/小时)从冰箱取出药物。请查询药物标签的说明,了解何时从冰箱取出药物。
- · 绝不要通过加热或微波处理药物来加速回温过程
- 使用干净的工作区域
- ・使用抗菌肥皂和温水彻底清洁双手 (如果没有肥皂和水可用,则使用含酒精的洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 按照指示收集用品和准备好您的 SASH 垫:

- **A.** SASH 垫 (见图 1)
- B. 静脉药物注射器
- C. 冲洗注射器
 - · _____ mL 生理盐水
 - ·______mL 肝素 _____ 单位/mL 肝素
- D. 酒精湿巾
- E. 锐器盒 (如需要) 和/或垃圾桶



出于演示目的,请遵循您的药物注射器上的说明。

2 | 检查药物注射器

检查每个药物注射器。查看注射器上的标签 (见图 2) 并验证:

- A. 患者姓名正确
- B. 药物名称正确
- C. 药物量/数量
- D. 计药物回温到室温所需的时间
- E. 药物的丢弃日期

每个注射器应没有裂缝、泄露、浮动颗粒或变色。如果注射器有问题或标签上的 任何内容不正确,则联系您的护士或药剂师。



静脉药物给用:静脉推注



3 准备您的冲洗注射器

- A. 在使用注射器前, 先别摘掉注射器头帽, 用力推拇指按压件, 直到感觉柱塞移动就好。
- B. 拧掉注射器头帽,向前推柱塞,排出空气和多余溶液。 按照护士指示的量排出多余溶液。(见图 3)
- C. 重新盖上注射器帽, 小心手不要触碰到注射器头。如果碰到, 则需要用干净的注射器从头开始。把注射器放在一边备用。
- D. 对需要注射剂量的所有冲洗注射器重复步骤。



4 用生理盐水冲洗您的静脉输液管

使用在第 3 步中准备好的一个生理盐水注射器。

- A. 用酒精湿巾擦试静脉导管上的无针接头至少 15 秒, 再自然风干。(见图 4)
- B. 取下牛理盐水冲洗注射器的保护帽。 不要在取下帽后触碰注射器头。



如果未盖帽的无菌注射器头触碰任何不干净表面,则丢弃该生理盐水冲洗注射器。

- C. 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管上的无针接头, 再顺时针 扭转,直至牢固连接。(见图 5)
- **D.** 如有需要,则打开静脉导管和/或静脉输液延伸组件上的夹具。
- E. 用"推/停"法冲洗静脉导管。不要在遇到阻力时尝试冲洗: 联系您的护士或药剂师。
 - ·_____mL 生理盐水
- F. 取下生理盐水冲洗注射器并丢入垃圾桶。

静脉药物给用:静脉推注



5 给用您的药物

- **A.** 用酒精湿巾擦试静脉导管上的无针接头至少 **15 秒**,再自然风干。 $(\Omega B 4)$
- B. 取下药物注射器的保护帽。
- **C.** 把药物注射器用力推入静脉导管上的无针接头,再顺时针扭转,直至牢固连接。 (见图 5)
- **D.** 按照护士的指示以及药物标签上的说明,在 _____ **分钟**内 注射您的药物。
- E. 给用完规定的剂量后取下药物注射器,并按指示丢弃。

6 用生理盐水冲洗您的静脉输液管

使用在第 3 步中准备好的一个生理盐水注射器。

- **A.** 用酒精湿巾擦试静脉导管上的无针接头至少 **15 秒**,再自然风干。 (DB 4)
- B. 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。 不要在取下帽后触碰注射器头。

如果未盖帽的无菌注射器头触碰任何不干净表面,则丢弃该生理盐水冲洗注射器。

- **C.** 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管上的无针接头,再顺时针扭转,直至牢固连接。 (见图 5)
- **D.** 用"推/停"法冲洗静脉导管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗; 联系您的护士或药剂师。
 - ·_____ mL 生理盐水
- E. 除非您得到使用肝素的指示, 否则请闭合静脉导管和/或静脉输液延伸组件上的夹具。
- F. 取下牛理盐水冲洗注射器并丢入垃圾桶。

静脉药物给用:静脉推注

7 用肝素冲洗您的静脉输液管 (如医嘱)

使用在第 3 步中准备好的肝素注射器。

- **A.** 用酒精湿巾擦试静脉导管上的无针接头至少 **15 秒**,再自 然风干。 $(\Omega B 4)$
- B. 取下肝素冲洗注射器的保护帽。 不要在取下帽后触碰注射器头。

如果未盖帽的无菌注射器头触碰任何不干净表面,则丢弃该肝素冲洗注射器。

- **C.** 把肝素冲洗注射器推入静脉导管上的无针接头,再顺时针扭转,直至牢固连接。 (见图 5)
- **D.** 用"推/停"法冲洗静脉导管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗; 联系您的护士或药剂师。
 - ·_____ mL 肝素 _____ 单位/mL 肝素
- E. 如有需要,则闭合静脉导管和/或静脉输液延伸组件上的夹具。
- F. 取下肝素冲洗注射器并丢入垃圾桶。

如有任何疑问或 疑虑, 联系您的护士或 医生



您的 Option Care Health 团队全年每天 24 小时随时协助您。

想要观看教学视频并获取额外教育资源,请访问 optioncarehealth.com/education.

(SASH) 程序摘要:

- · 用 _____ mL 生理盐水 (S, Saline) 冲洗静脉导管
- · 给用 (A, Administer) 药物 _____ 分钟
- ·用 _____ mL 生理盐水 (S, Saline) 冲洗
- ·如医嘱,用 _____ mL 肝素 (H, Heparin) 冲洗

