

肠内营养施用： 注射器/批式

请参阅“患者肠内
营养指南”手册，
了解额外信息。

本信息不旨在替代专业建议。
请遵照医生、护士、药剂师或
营养师给您的治疗建议。



图 1



图 2



图 3

准备开始

- 使用清洁的工作区域
- 使用肥皂和温水彻底清洁双手至少 20 秒
(如果没有肥皂和水, 请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 | 准备居家管饲

- A. 收集您的配方食物和用品, 放在清洁的工作区域。(参阅图 1)
- B. 确认配方食物盒上的到期日, 确保配方食物名称跟医嘱相符。用干净的抹布擦拭顶部, 开封前摇匀。

打开的配方食物盒应立即盖上并冷藏。
在 24 小时内或根据制造商的建议使用或弃置已打开的配方食物。

- C. 在腿上放一条毛巾, 因为在施用过程中配方食物可能会溢出。
- D. 坐直或者将床头抬起至少 30 至 45 度。请勿在管饲期间和之后至少一小时平躺。

2 | 施用管饲

- A. 如果饲管有夹具, 那么在打开饲管的末端之前, 请确保夹具处于关闭状态。如果饲管没有夹具, 那么在打开末端之前用手指捏住饲管。
- B. 打开饲管帽, 打开管子夹具, 用水慢慢冲洗饲管。(参阅图 2) 完成后取下注射器。
- C. 从注射器后端取出柱塞, 将注射器头插入饲管。
- D. 竖直持握注射器, 将配方食物缓慢倒入注射器开口, 像使用漏斗一样让配方食物通过重力自由流动。(参阅图 3) 继续向注射器倒入配方食物, 直至达到规定量。

快速施用可能造成不耐受。

肠内营养施用：注射器/批式



喂饲时间表	
配方 食物名称：	
目标量/ 天：	
目标速度：	
间隔/ 频率：	
额外备注：	

E. 喂饲完成后，使用注射器用水慢慢冲洗饲管。

F. 盖上饲管末端，并关闭管子夹具。

施用水冲洗

施用水冲洗是为了给患者充分补水，并防止输液管堵塞。

- 使用 60 mL 的注射器用温水缓慢冲洗饲管。
- 喂饲前用 _____ mL 水冲洗，喂饲后用 _____ mL 水冲洗
- 每天用额外 _____ mL 水冲洗

切勿过度用力冲洗饲管。

确保成功的提示

- 请勿在胃部不适或呕吐时进行管饲。
- 如果有饱腹的不舒服感觉，请减慢喂饲速度，或等待一小时后再进行喂饲。
- 请勿向输液管注入配方食物或水以外的任何东西，除非医疗保健提供者有明确的指示。

如有任何疑问或疑虑，
请致电您的护士或医生



您的 Option Care Health 团队全年无休随时待命
为您效劳。

想要观看教学视频并获取额外教育资源，
请访问 optioncarehealth.com/education。

Option Care Health 各分址均经过 ACHC 认可。HHA 号码可以在 optioncarehealth.com 查看。
©2021 Option Care Health, Inc. 保留所有权利。20OCH11027-1121



option care health®