

Preparação do medicamento

Consulte seu folheto “Guia do paciente para terapia de infusão” para obter informações adicionais.

Essas informações não substituem o aconselhamento profissional. Siga sempre as recomendações do seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.

Visão geral

Você preparará o medicamento de um frasco para adicioná-lo a uma bolsa IV.

Você preparará:

• Medicamento: _____

Quantidade: _____ ml

• Medicamento: _____

Quantidade: _____ ml

Introdução

- Use uma área de trabalho limpa
- Lave bem as mãos com sabão antibacteriano e água morna (se não tiver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para mãos a base de álcool)
- Seque suas mãos com uma toalha limpa

Reúna seus suprimentos:

- A. Frasco(s)/ampola(s) do medicamento
- B. Seringas com agulhas
- C. Agulhas filtrantes (se estiver preparando de uma ampola)
- D. Lenços umedecidos com álcool
- E. Recipiente para materiais perfurocortantes
- F. Outros _____

Preparação de medicamento de um frasco

- 1 | Remova a seringa da embalagem.
- 2 | Remova a tampa plástica do frasco do medicamento.

A aparência do frasco varia de acordo com o medicamento.

- 3 | Limpe a parte superior do frasco com um lenço umedecido com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinha.
- 4 | Puxe o êmbolo da seringa para coletar _____ ml de ar.
- 5 | Retire a tampa da agulha. Coloque-a dentro do frasco do medicamento (em ângulo reto de cima e para baixo, não inclinada). Injete o ar no frasco do medicamento. (Veja a Fig. 1)
- 6 | Vire o frasco de cabeça para baixo. Ajuste a agulha de forma que a ponta fique no líquido. Retire a quantidade desejada de líquido para a seringa. Verifique duas vezes a quantidade de medicamento retirada. (Veja a Fig. 2)



Fig. 1



Fig. 2

- 7 | Retire a seringa do frasco e coloque de volta cuidadosamente a tampa da agulha.
- 8 | Elimine qualquer excesso de ar e líquido até obter a quantidade que você foi instruído a preparar.
- 9 | Injete o medicamento na bolsa IV conforme as instruções de seu enfermeiro.
- 10 | Descarte os suprimentos usados conforme as instruções.

Preparação de medicamento de uma ampola

- 1 | Adicione uma agulha filtrante à seringa rosqueando-a na seringa. **NÃO** toque na ponta da agulha ou da seringa.
- 2 | Segure a ampola na vertical e bata na parte superior para retirar a solução do espaço livre. (Veja a Fig. 3)
- 3 | Esfregue o gargalo da ampola com um lenço umedecido com álcool.
- 4 | Envolve o lenço umedecido com álcool no gargalo da ampola e segure a parte superior com o polegar e o dedo indicador. Com a outra mão, segure o fundo da ampola. (Veja a Fig. 4)



- 5 | Quebre rapidamente a ampola, afastando suas mãos de você. Se a ampola não quebrar facilmente, gire-a um pouco e tente novamente.
- 6 | Coloque a tampa do frasco embrulhada no lenço umedecido com álcool de lado (ou coloque no recipiente para materiais perfurocortantes).
- 7 | Segure a ampola em um ângulo de cerca de 20 graus para baixo.
- 8 | Insira uma agulha filtrante na ampola tendo o cuidado de não tocar a borda quebrada do gargalo da ampola.

- 9 | Coloque a agulha no fundo da ampola, com a bora chanfrada para baixo. Isso ajudará a garantir que você retire todo o medicamento da ampola com a agulha. (Veja a Fig. 5)



- 10 | Retire a solução mantendo a ponta da agulha no líquido.
- 11 | Retire a agulha da ampola e coloque de volta cuidadosamente a tampa da agulha filtrante.
- 12 | Remova a agulha filtrante e descarte-a junto com o frasco vazio em um recipiente para materiais perfurocortantes.
- 13 | Sem tocar a ponta da seringa, prenda uma agulha normal à seringa cheia.
- 14 | Elimine qualquer excesso de ar e líquido até obter a quantidade que você foi instruído a preparar.
- 15 | Injete o medicamento na bolsa IV conforme as instruções de seu enfermeiro.
- 16 | Descarte os suprimentos usados conforme as instruções.