

Внутривенное (в/в) введение лекарственного препарата: струйное введение

Данная информация не предназначена для использования вместо профессиональных рекомендаций. Поэтому выполняйте рекомендации своего врача, медсестры или фармацевта.

Перед применением

- Посмотрите на этикетке лекарственного препарата указания, когда нужно доставать лекарственный препарат из холодильника.
- **НИКОГДА** не ускоряйте процесс размораживания лекарственных препаратов, подогревая их различными способами, в том числе в микроволновой печи.
- Подготовьте чистое рабочее место.
- Тщательно вымойте руки теплой водой и мылом в течение **20 СЕКУНД** (если мыло и вода недоступны, используйте антисептик для рук на спиртовой основе).
- Вытрите руки насухо чистым полотенцем.

1 | Подготовьте необходимые принадлежности и коврик SASH в соответствии с указаниями:

- A. Коврик SASH (См. рис. 1).
- B. Шприц с лекарственным препаратом для в/в введения.
- C. (2) промывочных шприца с солевым раствором.
- D. (1) промывочный шприц с гепарином (если назначено).
- E. Спиртовые салфетки.
- F. Контейнер для острых предметов и (или) контейнер для мусора.

2 | Осмотрите шприц с лекарственным препаратом

Осмотрите каждый шприц с лекарственным препаратом. Внимательно прочитайте этикетку на шприце (см. рис. 2) и проверьте, правильно ли указаны:

- A. Имя и фамилия пациента.
- B. Название лекарственного препарата.
- C. Объем/количество лекарственного препарата.
- D. Время, необходимое для нагревания препарата до комнатной температуры.
- E. Срок годности лекарственного препарата.

На шприцах не должно быть трещин, они не должны протекать, в содержимом не должно быть плавающих частиц, цвет содержимого не должен быть изменен. В случае выявления проблем со шприцами или неверных сведений на этикетке позвоните своей медсестре или фармацевту.




Рис. 1




Рис. 2

Изображение приводится только в демонстрационных целях. Выполняйте инструкции на этикетке ВАШЕГО шприца с лекарственным препаратом.



Рис. 3



Рис. 4

3 | Промойте инфузионную линию солевым раствором

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 3).
- B. Надавите на шток поршня промывочного шприца с солевым раствором, чтобы разорвать пломбу.
- C. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

Выбросьте промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный кончик без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- D. Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.
- E. Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному коннектору на в/в катетере путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом (см. рис. 4).
- F. Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- G. Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2–3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

НЕ пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- H. Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- I. После использования отсоедините и выбросьте шприц для промывки солевым раствором в контейнер для мусора.

4 | Введение лекарственного препарата

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 3).
- B. Снимите защитный колпачок со шприца с лекарственным препаратом.
- C. Надежно присоедините шприц с лекарственным препаратом к безыгольному коннектору на в/в катетере. Делайте это путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения (см. рис. 4).
- D. Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- E. Введите лекарственный препарат в соответствии с инструкциями на этикетке лекарственного препарата.
- F. Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- G. Отсоедините шприц, в котором находился лекарственный препарат, после введения назначенной дозы и выбросьте его в контейнер для мусора.



5 | Промойте инфузионную линию солевым раствором

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 3).
- B. Надавите на шток поршня промывочного шприца с солевым раствором, чтобы разорвать пломбу.
- C. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

Выбросьте промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный кончик без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- D. Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.
- E. Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному коннектору на в/в катетере путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом (см. рис. 4).
- F. Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- G. Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2–3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

НЕ пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- H. Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- I. После использования отсоедините и выбросьте шприц для промывки солевым раствором в контейнер для мусора.

6 | Промойте инфузионную линию гепарином (если назначено)

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 3).
- B. Надавите на шток поршня промывочного шприца с гепарином, чтобы разорвать пломбу.
- C. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с гепарином. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

Выбросьте промывочный шприц с гепарином, если стерильный кончик без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- D. Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.



6 | Промойте инфузионную линию гепарином (если назначено) *Продолжение...*

- E.** Подсоедините промывочный шприц с гепарином к безыгольному коннектору путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом *(см. рис. 4)*.
- F.** Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- G.** Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2–3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

НЕ пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- H.** Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузионной линии.
- I.** После использования отсоедините и выбросьте шприц для промывки гепарином в контейнер для мусора.

Со всеми вопросами и проблемами обращайтесь к медсестре или врачу

Ваша группа медицинских специалистов из Option Care Health готова предоставить помощь по телефону в режиме 24/7/365.



Чтобы посмотреть видеоинструкции или ознакомиться с дополнительными учебно-просветительскими ресурсами, посетите веб-сайт optioncarehealth.com/education.

Отделения Option Care Health аккредитованы Комиссией по аккредитации медицинских учреждений (Accreditation Commission for Health Care, ACHC). Номера организаций по медицинскому обслуживанию на дому (Home Health Agencies, ННА) можно посмотреть на веб-сайте optioncarehealth.com.

© Option Care Health, Inc., 2022 г. Все права защищены. 200CH11005-0422



option care health®